

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アロピラリンS
2	成分・分量	<p>1回量(2錠)中 アセトアミノフェン……………200mg エテンザミド……………317mg アリルイソプロピルアセチル尿素……60mg 無水カフェイン………50mg ジリュウエキス……………20mg (原生薬換算量 154mg) カンゾウ乾燥エキス……………47mg (原生薬換算量 233mg)</p> <p>添加物としてステアリン酸 Mg, メタケイ酸アルミン酸 Mg, セルロース, クロスカルメロース Na を含有する.</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日3回を限度とし,なるべく空腹時をさけ,4時間以上あけて服用してください.</p> <p>15才以上:1回2錠,7~15才未満:1回1錠,5~7才未満:1回1/2錠, 5才未満:服用しないこと</p>
4	効能・効果	<p>☆頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛</p> <p>☆悪寒・発熱時の解熱</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人. (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬,かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人.</p> <p>2. 本剤を服用している間は,次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬,かぜ薬,鎮静薬,乗物酔い薬.</p> <p>3. 服用後,乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがある)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください. (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人. (2)妊婦又は妊娠していると思われる人. (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満) (4)高齢者. (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人. (6)次の診断を受けた人. 心臓病,腎臓病,肝臓病,胃・十二指腸潰瘍</p>
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。