

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	<b>ハイセーフー I B</b>
2	成分・分量	<p>1 日量(6 カプセル)中                  イブプロフェン……………450mg    チペピジンヒベンズ酸塩……………75mg                  クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg    dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg                  カンゾウ乾燥エキス……………64mg(原生薬換算量 500mg)                  キキョウ乾燥エキス……………40mg(原生薬換算量 400mg)                  無水カフェイン……………75mg</p> <p>添加物として乳糖, トウモロコシデンプン, カルメロース Ca, ヒドロキシプロピルセルロース, 部分アルファー化デンプン, ゼラチン・ラウリル硫酸 Na を含有する.</p>
3	用法・用量	<p>次の 1 回量を 1 日 3 回食後なるべく 30 分以内に服用してください。                  大人(15 才以上): 1 回 2 カプセル, 15 才未満: 服用しないこと</p>
4	効能・効果	<p>かぜの諸症状(鼻みず, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p><b>1. 次の人は服用しないでください</b>                  (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。                  (2) 本剤又は他のかぜ薬, 解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。                  (3) 15 才未満の小児。                  (4) 出産予定日 12 週以内の妊婦。</p> <p><b>2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も使用しないでください</b>                  他のかぜ薬, 解熱鎮痛薬, 鎮静薬, 鎮咳去痰薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬等)</p> <p><b>3. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください</b>                  (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p><b>4. 服用前後は飲酒しないでください</b></p> <p><b>5. 5 日間を超えて服用しないでください</b></p> <p><b>次に該当する人はお申し出ください。</b>                  (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。                  (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。                  (3) 授乳中の人。                  (4) 高齢者。                  (5) 薬などよりアレルギー症状を起こしたことがある人。                  (6) 次の症状のある人。    高熱, 排尿困難                  (7) 次の診断を受けた人。    甲状腺機能障害, 糖尿病, 心臓病, 高血圧, 肝臓病, 腎臓病, 緑内障, 全身性エリテマトーデス, 混合性結合組織病                  (8) 次の病気にかかったことがある人。    胃・十二指腸潰瘍, 潰瘍性大腸炎, クロウン病</p>
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。