

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児用ハイセーフーS a
2	成分・分量	<p>1 日量(30mL) 中</p> <p>アセトアミノフェン・・・・・・・・・・300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩・・2.5mg</p> <p>dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・20mg</p> <p>デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・・・・・・・・・・16mg</p> <p>グアイフェネシン・・・・・・・・・・80mg 無水カフェイン・・・・・・・・・・25mg</p> <p>添加物としてエタノール, カラメル, 精製白糖, クエン酸, クエン酸 Na, 安息香酸, パラベン, 香料を含有する.</p>
3	用法・用量	<p>次の1回量を1日3回毎食後及び必要な場合は, 就寝前に服用してください. また場合により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用してください.</p> <p>3~7才未満:1回 5mL, 1~3才未満:1回 3.5mL, 6ヶ月~1才未満:1回 3mL,</p> <p>3ヶ月~6ヶ月未満:1回 2mL, 3ヶ月未満:服用しないこと</p> <p>※2歳未満の乳幼児には, 医師の診療を受けさせることを優先し, やむを得ない場合にのみ服用させていただきます.</p>
4	効能・効果	<p>かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒(発熱によるさむけ), 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和.</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人.</p> <p>(2)本剤又は他のかぜ薬, 解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人.</p> <p>2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も使用しないでください</p> <p>他のかぜ薬, 解熱鎮痛薬, 鎮静薬, 鎮咳去痰薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬等).</p> <p>3. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>(眠気があらわれることがあります)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>5. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください.</p> <p>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人.</p> <p>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人.</p> <p>(3)授乳中の人</p> <p>(4)高齢者.</p> <p>(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.</p> <p>(6)次の症状のある人. 高熱, 排尿困難</p> <p>(7)次の診断を受けた人. 甲状腺機能障害, 糖尿病, 心臓病, 高血圧, 肝臓病, 腎臓病, 胃・十二指腸潰瘍, 緑内障</p> <p>【小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。】</p>
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.