医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	**エフストリンせきどめ液**
2	成分・分量	1 日量(60mL)中 ジヒドロコデインリン酸塩・・・・・・30mg　dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・75mg グアイフェネシン・・・・・・・・・・・・300mg　d-クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・6mg 無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・120mg バクモンドウ流エキス・・・・・・・・1.25mL(バクモンドウ 1.25g に相当) 添加物としてカラメル, 精製白糖, クエン酸, クエン酸 Na, 安息香酸, パラベン, プロピレングリコール, 香料, エタノール, エチルバニリン, グリセリン, バニリンを含有する.
3	用法・用量	次の 1 回量を 1 日 3 回毎食後及び必要な場合には, 就寝前に服用してください. また, 場合によっては, 1 日 6 回まで約 4 時間の間隔をおいて服用してください. 15 才以上:1 回 10mL, 12 才以上 15 才未満:1 回 6mL, 12 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	せき, たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	**1. 次の人は服用しないでください** (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことのある人. (2)12 才未満の小児. **2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も使用しないでください** 他の鎮咳去痰薬, かぜ薬, 鎮静薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬等) **3. 服用後, 乗物又は, 機械類の運転操作をしないでください** (眠気等があらわれることがあります) **4. 授乳中の人は本剤を服用しないか, 本剤を服用する場合は授乳を避けてください.** **5. 過量服用・長期連用しないでください** **次に該当する人はお申し出ください.** (1)医師の治療を受けている人. (2)妊婦又は妊娠していると思われる人. (3)高齢者. (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人. (5)次の症状のある人.　高熱, 排尿困難 (6)次の診断を受けた人.　心臓病, 高血圧, 糖尿病, 緑内障, 甲状腺機能障害, 呼吸機能障害, 閉塞性睡眠時無呼吸症候群, 肥満症
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.