

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新第一赤玉はら薬
2	成分・分量	1 日量(54 丸)中 オウバク末……………720mg センブリ末……………30mg オウレン末……………150mg ゲンノショウコ末……480mg ロートエキス散………300mg(ロートエキスとして 30mg) 添加物としてバレイショデンプン, デヒドロ酢酸 Na, 乳糖, 寒梅粉, アラビアゴム, 炭酸 Ca, タルク, 酸化チタン, ゼラチン, 赤色 102 号, 黄色 5 号を含む。
3	用法・用量	次の1回量を, 1日3回を限度として服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。 成人(15才以上):1回 18丸(1包), 11才以上 15才未満:1回 12丸, 8才以上 11才未満:1回 9丸, 5才以上 8才未満:1回 6丸, 5才未満:服用しないでください
4	効能・効果	下痢, 消化不良による下痢, 食あたり, はき下し, 水あたり, くだり腹, 軟便, 腹痛を伴う下痢
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は, 次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬, ロートエキスを含有する他の胃腸薬, 乗物酔い薬 2. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (目のかすみ, 異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 3. 授乳中の人には本剤を服用しないか, 本剤を服用する場合は授乳をさけてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。) 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 発熱を伴う下痢のある人, 血便のある人又は粘液便の続く人。 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4) 高齢者。 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6) 次の症状のある人。 排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。 心臓病, 緑内障
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。