

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	スリムラック
2	成分・分量	1 日量(3 錠)中 ビスコジル……15mg          センノシド……40mg  添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸 Mg、ヒプロメロース、メタクリル酸コポリマーLD、クエン酸トリエチル、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、沈降炭酸 Ca、酸化チタン、カルメロース Na、カルナウバロウ、赤色 3 号を含有する。
3	用法・用量	次の1回量を1日1回、就寝前(または空腹時)に服用します。ただし、初回は最少量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。 15 才以上:1 回 2~3 錠, 11 才以上 15 才未満:1 回 1~2 錠, 11 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	便秘 便秘に伴う次の症状の緩和:頭重, のぼせ, 肌あれ, 吹出物, 食欲不振(食欲減退), 腹部膨満, 腸内異常発酵, 痔
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<b>1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください</b> 他の瀉下薬(下剤) <b>2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</b> <b>3. 大量に服用しないでください</b>  <b>次に該当する人はお申し出ください。</b> (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)次の症状のある人。 はげしい腹痛, 吐き気・嘔吐
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。