

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ユーシップ i
2	成分・分量	膏体 100g 中(1 枚 10g) インドメタシン……0.5g 添加物として、エデト酸 Na, ポリソルベート 80, トメントール, グリセリン, D-ソルビトール, マクロゴール, CMC-Na, カルボキシビニルポリマー, 酸化チタン, ポリアクリル酸部分中和物, ポリビニルアルコール(部分けん化物), ヒマシ油, pH 調節剤, その他 2 成分を含有する。
3	用法・用量	15 歳以上:表面のプラスチックフィルム(ライナー)をはがし, 1 日 2 回を限度として患部に貼付してください。 15 歳未満:使用しないでください
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 筋肉痛, 関節痛, 肘の痛み(テニス肘など), 腱鞘炎(手・手首の痛み), 打撲, 捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤, かゆみ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15 歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲, 粘膜等。 (2)湿疹, かぶれ, 傷口。 (3)みずむし, たむし等又は化膿している患部。 3. 連続して 2 週間以上使用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。