

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	オムニードフェルビナク 70
2	成分・分量	膏体 100g 中 フェルビナク・・・0.5g(1 枚中フェルビナク 70mg 添加物として トメントール, ジイソプロパノールアミン, カルボキシビニルポリマー, 酸化チタン, カオリン, エデト酸 Na, D-ソルビトール, プロピレングリコール, クロタミトン, ポリアクリル酸 Na, ポリアクリル酸, グリセリン, pH 調整剤, その他 3 成分を含有する。
3	用法・用量	15 才以上:表面のライナーをはがし、1 日 2 回を限度として患部に貼付してください。 15 才未満:使用しないこと
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤, かゆみ, かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4)15 歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲, 粘膜等。 (2)湿疹, かぶれ, 傷口。 (3)みずむし, たむし等又は化膿している患部。 3. 連続して 2 週間以上使用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。