

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 名称                    | ビーエスパン FR テープ V 大判                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | 成分・分量                 | 膏体 100g 中<br>フェルピナク……5.0g トメントール……4.2g<br>トコフェロール酢酸エステル……2.3g<br><br>添加物としてジイソプロパノールアミン、ポリイソブチレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、その他 2 成分を含有する。                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | 用法・用量                 | 15 才以上:表面のライナーをはがし、1 日 2 回を限度として患部に貼付してください。<br>15 才未満:使用しないこと                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 効能・効果                 | 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <b>1. 次の人は使用しないでください。</b><br>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。<br>(2)ぜんそくを起こしたことがある人。<br>(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。<br>(4)15 歳未満の小児。<br><b>2. 次の部位には使用しないでください。</b><br>(1)目の周囲、粘膜等。<br>(2)湿疹、かぶれ、傷口。<br>(3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。<br><b>3. 連続して 2 週間以上使用しないでください。</b><br><br><b>次に該当する人はお申し出ください。</b><br>(1)医師の治療を受けている人。<br>(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| 6 | 薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。