

医薬品を正しく購入するための
説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ロキエフェクトLXパップ
2	成分・分量	膏体 100g 中 ロキソプロフェンナトリウム水和物……1.134g(無水物として 1g) 添加物としてエデト酸ナトリウム水和物, l-メントール, カルボキシビニルポリマー, カルメロースナトリウム, グリセリン, 酸化チタン, D-ソルビトール, pH 調節剤, ポリアクリル酸部分中和物, ポリソルベート 80, メチルセルロース, その他 3 成分を含有する.
3	用法・用量	15 才以上:表面のライナーをはがし, 1 日 1 回患部に貼付してください. 15 才未満:使用しないこと
4	効能・効果	関節痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 筋肉痛, 腰痛, 打撲, 捻挫, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください. (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人. (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬, かぜ薬, 外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人. (3)15 歳未満の小児. 2. 次の部位には使用しないでください. (1)目の周囲, 粘膜等. (2)しっしん, かぶれ, 傷口. (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部. 次に該当する人はお申し出ください. (1)医師の治療を受けている人. (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人. (3)妊婦又は妊娠していると思われる人. (4)高齢者 (5)次の診断を受けた人:気管支ぜんそく
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.