

## 使用上の注意改訂のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「ジヒドロコデインリン酸塩」を含有する製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

改訂後	改訂前
してはいけないこと 「授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。」 を追記	
相談すること 「授乳中の人」 を削除	相談すること 「授乳中の人」

### ・対象製品

かぜ薬	鎮咳去痰薬
ハイセーフーS 顆粒 小児用ハイセーフーS	エフストリン液 新エフストリン液 エフストリンせきどめ液 エフストリンせきどめ液 10 新コデステシン液 ビスティーせき止め液 エフストリン エフストリン顆粒 K コデステシン錠 ビスティーせき止め顆粒

### ・改訂理由

[厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡：2009年12月1日付]

類似化合物（コデイン）で、母乳への移行により、乳児にモルヒネ中毒が生じたとの報告があったため。