

使用上の注意改訂(アセトアミノフェン)のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「アセトアミノフェン」を含有する製品(解熱鎮痛薬、かぜ薬)の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

・改訂内容

解熱鎮痛薬	
相談すること	
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること	
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること	
症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

※下線部が追加された内容です。

かぜ薬	
相談すること	
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること	
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること	
症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</u>
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	<u>発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。</u>
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
※下線部が追加された内容です。	

・対象品目(8品目)

解熱鎮痛薬	かぜ薬
アロピラリン S	ハイセーフーS 顆粒
	小児用ハイセーフーS
	ドニーK 顆粒
	ビスティーM 顆粒
	ビスティーSC
	ビスティーこども用かぜシロップ
	チルデントこども用かぜシロップ

・改訂理由

平成 24 年 3 月 19 日付 薬食安発 0319 第 1 号 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知による。