

使用上の注意改訂(アセトアミノフェン)のお知らせ

お客様各位

大昭製薬株式会社

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「アセトアミノフェン」を含有する製剤(かぜ薬、解熱鎮痛薬)の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

・改訂内容

相談すること

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(省略)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
(省略)	(省略)
薬剤性過敏症 症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
(省略)	(省略)

※下線部が追加された内容です。

・対象品目(13品目)

かぜ薬	解熱鎮痛薬
小児用一風飲「コタロー」(製造中止品目)	アセトアミノフェン AF 錠
小児用ハイセーフーSa	アセトアミノフェン C 錠
総合感冒薬 QG(製造中止品目)	アロピラリン S
チルデントこども用かぜシロップ	ディパシオ ACa
ドニーK 顆粒	プレミナス ACa
ハイセーフーS 顆粒	
ヘルビック S 顆粒	
ヘルビック S 顆粒・ゴールド	

※製造中止品目については添付文書の改訂は行いませんが、該当しますので注意してください。

・改訂理由

令和5年1月17日付 薬生安発0117第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知による。