

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 消炎鎮痛パップ剤

### 第2類医薬品



#### [特長]

- ユーシップ®は、「インドメタシン」を0.5%配合し、痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわします。
- ユーシップ®は、粘着性に優れた基剤と伸縮自在の不織布を使用していますので、ひじやひざにもよくフィットします。



#### (使用上の注意)

##### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3)15歳未満の小児。
- ##### 2. 次の部位には使用しないでください
- (1)目の周囲、粘膜等。
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- ##### 3. 連続して2週間以上使用しないでください

##### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂

電 話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

#### [効能・効果]

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、肘の痛み(テニス肘など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、打撲、捻挫

#### [用法・用量]

表面のプラスチックフィルム(ライナー)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

#### [使用方法]

- 片側のフィルムをはがし、薬面を患部に貼り、残りの片側のフィルムをはがします。

- 汗でぬれている時は、よくふきとてから使用してください。

#### [用法・用量に関する注意]

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。

(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

#### [成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚10g)

インドメタシン…0.5g

添加物としてエドテ酸Na、ポリソルベート80、l-メントール、グリセリン、D-ソルビトール、マクロコール、CMC-Na、カルボキシビニルポリマー、酸化チタン、ポリacrylic acid部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、pH調節剤、その他2成分を含有します。

#### [保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地