

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要時に読めるように大切に保管してください。

## 第2類医薬品

# 温感 ビーエスバンFRテープV

### 【特長】

- 温感ビーエスバンFRテープVは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、関節痛、腰痛、肩の痛みなどに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり35mg配合しています。
- 温感ビーエスバンFRテープVは柔軟性のある基布を使用していますので、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

### ⚠️ (使用上の注意)

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化粧している患部。

#### 3. 連続して2週間以上使用しないでください

#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、痛み、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、(しゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等)があらわれます。

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

#### 【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておいてください。また、入浴直後の貼付は避けてください。

#### 【成分・分量】 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク	5.0g
l-メントール	3.0g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g

添加物としてステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリイソブレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ノナン酸バニリルアミド、その他2成分を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチェックを開けて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

