

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

虫さされ、かゆみに

モスキューPVA液11

<特徴>

- モスキューPVA液11は、アンテドラッグステロイドのプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)を配合した液剤です。
- アンテドラッグステロイドとは、皮膚表面の患部で優れた効果を発揮し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解され全身性の副作用を軽減するステロイド剤です。
- 3つの抗炎症成分プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)、グリチルレチン酸、サリチル酸グリコール、3つのかゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、ジブカイン塩酸塩等、11の有効成分が虫さされやかゆみに効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|-----------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

(裏面もご覧ください。)

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《使用方法》

1. 使用前に容器を上向きにし、スポンジ中央部を数回押して中の空気を抜いてください。
2. スポンジを患部に数回押しあて、スポンジに薬液を十分にしみ込ませてから使用してください。
薬液がスポンジに十分しみ込んでいないとスポンジが破損することがあります。

《用法・用量に関連する注意》

1. 定められた用法・用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみ使用してください。
5. 本剤の塗布後、わずかにほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。
6. 本剤を塗布後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】 100mL中

| 成分 | 分量 | 作用 |
|---------------------------|-------|-------------------------------|
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) | 0.15g | 抗炎症作用により、炎症によるはれや赤みを抑えます。 |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 1.00g | かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。 |
| クロタミトン | 5.00g | 患部のかゆみを鎮めます。 |
| グリチルレチン酸 | 0.30g | 非ステロイド性の抗炎症作用により、炎症を抑えます。 |
| サリチル酸グリコール | 1.00g | 炎症による痛みを抑えます。 |
| アラントイン | 0.20g | 患部の組織を修復し、患部の治りをはやめます。 |
| イソプロピルメチルフェノール | 0.10g | 殺菌作用により、患部の感染を防ぎます。 |
| ジブカイン塩酸塩 | 0.25g | 局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。 |
| d l -カンフル | 1.00g | 患部に清涼感を与え、かゆみを鎮めます。 |
| l -メントール | 3.50g | |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.50g | 血行を促進し、治りを助けます。 |

添加物：エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、プロピレングリコール、BHT、乳酸、乳酸Na

【保管及び取扱い上の注意】

1. 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして立てて保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 火気に近づけないでください。
5. メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であってもなるべく早く使用してください。

火気厳禁

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

電話 0744-22-2440

受付時間9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

製造販売元

株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地
2301-AHI