

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1瓶(50mL)中

- イカリ草エキス……………10mg
(インヨウカク100mgに相当)
- エゾウコギエキス-S……………25mg
(シゴカ500mgに相当)
- ハゲキテン流エキス……………0.2mL
(ハゲキテン200mgに相当)
- 反鼻流エキス……………50μL
(ハンビ50mgに相当)
- ロクジョウチンキ-N……………35μL
(ロクジョウ10mgに相当)
- ローヤルゼリー……………50mg
- タウリン……………500mg
- イノシトール……………50mg
- チアミン塩化物……………5mg
- ピリドキシン塩酸塩……………10mg
- 無水カフェイン……………50mg
- ニコチン酸アミド……………20mg
(アルコール0.5mL以下)

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、酒石酸、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、ショウキョウチンキ、プロピレングリコール、安息香酸、パラベン、香料、エタノール、ベンジルアルコール、グリセリン、パニコリン

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

第2類医薬品

50mL

肉体疲労時の栄養補給に

新アコゲン®W

ロク	ジョウ
鹿	茸
抽出エキス配合	
イカリ	ソウ
礎	草

製造販売元

大昭製薬株式会社

〒461-8588 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

各登録商標

【用法・用量】 020107-0

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

●定められた用法・用量を厳守してください。

【その他の注意】

本剤は生薬成分を含むため、濁りや沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶
金属：キャップ



使用期限

製造番号

おくすり相談室 0748-88-4181
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)