

この添付文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。



和漢薬製剤

日野 実母散

(製品名：日野実母散)

第2類医薬品

女性特有の症状には、頭痛・いらいらなどがありますが、特に生理時・産前産後・更年期にはげしく、いくつかの症状が重なってからだ全体に不快感となってあらわれてきます。

日野実母散は、これらの症状にはたらく和漢薬を配合したもので緩やかに作用し、女性特有の症状である月経不順・血の道症・頭痛及び風邪などの諸症状に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

産前産後、血の道、月経不順、頭痛、ヒステリー、引風によし

■用法・用量

1日1貼を、3回、毎食前30分に次の通り服用してください。

年 齢	服 用	服用方法及び服用量
16歳以上(大人)	1、2回目	そのつど約200mL(約1合)の熱湯を加えて振り出し、その全量を温服する。
	3回目	約300mL(約1合5勺)の水を加えて半量になるまで煎じ、その全量を温服する。
8歳以上16歳未満	1、2回目	そのつど約200mL(約1合)の熱湯を加えて振り出し、その半量を温服する。
	3回目	約300mL(約1合5勺)の水を加えて半量になるまで煎じ、更にその半量を温服する。

年 齢	服 用	服用方法及び服用量
4歳以上8歳未満	1、2回目	そのつど約200mL（約1合）の熱湯を加えて振り出し、その1/3量を温服する。
	3回目	約300mL（約1合5勺）の水を加えて半量になるまで煎じ、更にその1/3量を温服する。
4歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

1貼12g中に次の成分を含有しています。

トウキ	1.0g
センキュウ	1.5g
シャクヤク	1.0g
サフラン	0.02g
ポタンピ	0.6g
ニンジン	0.1g
コウカ（ベニバナ）	0.1g
カンゾウ	0.3g
ケイヒ	1.0g
コウブシ	1.0g
ブクリョウ	0.8g
モッコウ	1.0g
ソウジュツ	1.0g
シュクシャ	0.38g
チョウジ	0.2g
チンピ	2.0g

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4)1回目及び2回目の振り出し後は、そのつどただちにラップ等で包み、次回の服用時まで冷蔵庫等直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話：0748-52-1232 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119