

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ポード
2	成分・分量	1 瓶(10mL)中 スコポラミン臭化水素酸塩水和物……0.22mg ピリドキシン塩酸塩……20mg クエン酸カフェイン……80mg 添加物として D-ソルビトール, デヒドロ酢酸 Na, 香料, エタノール, バニリンを含む。
3	用法・用量	乗物酔いの予防には, 乗車船 30 分前に1回量を服用してください。なお必要に応じて追加服用する場合には, 下記用量を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日2回まで服用できます。 15 才以上:1 回1瓶(10mL), 7 才以上 15 才未満:1 回 1/2 瓶(5mL), 7 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	乗物酔いによる めまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の乗物酔い薬, かぜ薬, 解熱鎮痛薬, 鎮静薬, 鎮咳去痰薬, 胃腸鎮痛鎮痙薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬, アレルギー用薬等) 2. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ, 異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります) 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。 緑内障, 心臓病
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。