

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エフストリン顆粒K
2	成分・分量	1 日量(3 包) 中 ジヒドロコデインリン酸塩……30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩……75mg グアイフェネシン……300mg クロルフェニラミンマレイン酸塩……12mg 無水カフェイン……100mg ナンテンジツエキス……350mg(原生薬換算量 1.925g) カンゾウエキス……300mg(原生薬換算量 0.9g) ウイキョウエキス……150mg(原生薬換算量 3.0g) 添加物としてセルロース, 乳糖, トウモロコシデンプン, サッカリン Na, d-ボルネオール, ヒドロキシプロピルセルロース, ポビドンを含む。
3	用法・用量	次の1回量を1日3回食後に服用してください。 15 才以上:1 回 1 包, 12~15 才未満:1 回 2/3 包, 12 才未満:服用しないこと
4	効能・効果	せき, たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 12 才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬, かぜ薬, 鎮静薬, 抗ヒスタミン剤を含む内服薬等(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬等) 3. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか, 本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 5. 過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 高齢者。 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5) 次の症状のある人。 高熱, 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。 心臓病, 高血圧, 糖尿病, 緑内障, 甲状腺機能障害 呼吸機能障害, 閉塞性睡眠時無呼吸症候群, 肥満症 【小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。