

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	小児エフストリンシロップ
2	成分・分量	1 日量(60mL) 中 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物・・・20mg グアイフェネシン・・・・・・・・100mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・25mg クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・4mg 添加物としてエタノール, カラメル, 白糖, クエン酸, 安息香酸, パラベン, 香料, エチルバニリン, グリセリン, プロピレングリコール, バニリンを含有する.
3	用法・用量	次の1回量を1日3～4回毎食後及び必要な場合には, 就寝前に服用してください. また, 1日5～6回服用する場合には, 原則として約4時間の間隔をおいて服用してください. 5～8 才未満:1 回 10mL, 3～5 才未満:1 回 6mL, 3 ヶ月～3 才未満:1 回 3mL, 3 ヶ月未満:服用しないこと ※2才未満の乳幼児には, 医師の診療を受けさせることを優先し, 止むを得ない場合にのみ服用させていただきます.
4	効能・効果	せき, たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人. 2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬, かぜ薬, 鎮静薬, 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬, 乗物酔い薬, アレルギー用薬等) 3. 服用後, 乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4. 過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください. (1)医師の治療を受けている人. (2)妊婦又は妊娠していると思われる人. (3)授乳中の人. (4)高齢者. (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人. (6)次の症状のある人. 高熱, 排尿困難 (7)次の診断を受けた人. 心臓病, 高血圧, 糖尿病, 緑内障, 甲状腺機能障害
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.