医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	温感ロキエフェクト LX テープ α
2	成分・分量	膏体 100g 中 ロキソプロフェンナトリウム水和物・・・・8.1g(無水物として 7.14g) トコフェロール酢酸エステル・・・・・・2.3g ノナン酸バニリルアミド・・・・・・・0.003g 添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂, 水添ロジングリセリンエステル, スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体, ポリイソブチレン, 流動パラフィン, その他 1 成分を含有する.
3	用法・用量	15 才以上:表面のライナーをはがし, 1 日 1 回患部に貼付してください. 15 才未満:使用しないこと
4	効能・効果	関節痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 筋肉痛, 腰痛, 打撲, 捻挫, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等。 (2)しっしん、かぶれ、傷口。 (3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4)高齢者 (5)次の診断を受けた人:気管支ぜんそく
6	薬剤師又は登録 販売者が必要と 判断する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です.
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません.
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.