

## 使用上の注意改訂(ジヒドロコデインリン酸塩)のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「ジヒドロコデインリン酸塩」を含有する製剤(かぜ薬、鎮咳去痰薬)の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

### ・改訂内容

かぜ薬・鎮咳去痰薬	
相談すること	
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること	
次の診断を受けた人	
<u>呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</u>	
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること	
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること	
症状の名称	症 状
<u>呼吸抑制</u>	<u>息切れ、息苦しさ等があらわれる。</u>
【用法及び用量に関連する注意】	
・12歳未満の用法及び用量がある場合	
<u>12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。</u>	
・7歳未満の用法及び用量の場合	
<u>7歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。</u>	
※下線部が追加されます。	

### ・改訂理由

平成29年7月4日付 薬生安発 0704 第 1 号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知による。

・対象品目

かぜ薬(4品目)	
小児用ハイセーフーS	ヘルビック S 顆粒
ハイセーフーS 顆粒	ヘルビック S 顆粒・ゴールド

鎮咳去痰薬(13品目)	
エフストリン	新コデステシン液
エフストリン液	ドニーせき止め P
エフストリン顆粒 K	NID せき止め液 1 回量飲みきりタイプ
エフストリンせきどめ液	ビスティーせき止め液
エフストリンせきどめ液 10	ビスティーせき止め顆粒 N
コデステシン錠	ビスティーせき止め顆粒
新エフストリン液	